

Thüringer Qualitäts- Saatmischungen für den Ackerfutterbau (mit Eignung für KULAP) 2014/15

EIGNUNG der Qualitäts-Saatmischungen	
einsömmeriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau	
Saattermin:	März/April
vorwiegende Nutzungseignung:	A2 Silage, Heu 1.1. Silage, Heu 1.2. Frischfutter
überjähriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau	
Saattermin:	Ende Juli bis Anfang September
vorwiegende Nutzungseignung:	A1 Silage, Heu 2.1. Silage, Heu 2.2. Silage, Heu 2.3. Silage 2.4. Frischfutter
zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau	
Saattermin:	März/April
vorwiegende Nutzungseignung:	3.1. Frischfutter, Silage, Heu 3.2. Silage, Heu 3.3. Frischfutter 3.4. Frischfutter, Silage, Heu 3.5. Frischfutter 3.6. Silage, Heu 3.7. Silage, Heu 3.8. Silage, Heu 3.9. Silage, Frischfutter, Heu 3.10. Silage, Frischfutter, Heu

Die Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau berücksichtigen langjährige praktische Erfahrungen sowie Versuchsergebnisse und entsprechen den Standortbedingungen im Freistaat Thüringen.

ANBAUGEBIETE für den mehrschnittigen Ackerfutterbau in Thüringen

6 sommertrockene Lagen

< 350 m über NN
< 600 mm Jahresniederschlag
> 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

7 günstige Übergangslagen

350 - 600 m über NN
600 - 800 mm Jahresniederschlag
6 - 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

SORTENEMPFEHLUNGEN			
Dt. Weidelgras, früh	AG	Einjähriges Weidelgras	AG
Arvicola (t)	6, 7	Jumpet (t)	6, 7
Giant (t)	7	Lemnos (t)	6, 7
Lacerta (t)	7	Melworld	6, 7
Salamandra (t)	6, 7	Volubyl	6, 7
Dt. Weidelgras, mittel		Bastardweidelgras	
Aktiva (t)	7	Acrobat (t)	6, 7
Alligator (t)	7	Astoncrusader (t)	6, 7
Arsenal	7	Enduro (t)	6, 7
Dexter 1 (t)	7	Ibex (t)	6, 7
Eurocity	7	Leonis (t)	6, 7
Eurostar (t)	6, 7	Pirol	6, 7
Lidelta (t)	6, 7	Rusa (t)	6, 7
Premium	6, 7	Wiesenschwingel	
Trivos (t)	6	Cosmolit	6, 7
Dt. Weidelgras, spät		Cosmonaut	6, 7
Barélan (t)	6, 7	Liherold	6, 7
Barpasto	6, 7	Pardus	6, 7
Forza (t)	6, 7	Pradel	6, 7
Kentaur (t)	6, 7	Preval	6, 7
Montova (t)	6, 7	Wiesenlieschgras	
Navarra	7	Comer	6, 7
Novello (t)	7	Licora	6, 7
Polim (t)	7	Lischka	6, 7
Thalassa (t)	7	Knaulgras	6, 7
Vesuve (t)	6, 7	Baridana	6, 7
Welsches Weidelgras		Treposno	6, 7
Dolomit (t)	6, 7	Festulolium	
Jeanne (t)	6, 7	Fedoro	6, 7
Lipos (t)	7	Lifema	6, 7
Melquatro (t)	6, 7	Mahulena ¹⁾	6, 7
Oryx	6, 7	Paulita	6, 7
Tarandus (t)	6, 7	Glathäfer	
Zarastro	6	Arone	6, 7
Luzerne		Rotklee	
Fee	6, 7	Astur (t)	6, 7
Fiesta	6, 7	Atlantis (t)	6, 7
Filla	6, 7	Kontiki	7
Sanditi	6, 7	Larus (t)	6, 7
Verko	7	Magellan (t) ²⁾	6, 7
Persischer Klee		Milvus	6, 7
Felix	6, 7	Taifun (t) ²⁾	6, 7
		Tempus (t) ²⁾	7
		Titus (t) ²⁾	6, 7
		Tornado (t)	6, 7

(t) = tetraploide Sorte ¹⁾ = sehr langsame Jugendentwicklung
²⁾ = in Stängelfrennbereichen nicht geeignet

Herausgeber: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Naumburger Str. 98, 07743 Jena
 Tel.: 03641 683-0, Fax: 03641 683-390

Bearbeiter: Harald Hegner, Dr. Walter Peyker

Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten.

Jena, im Oktober 2014



